



# ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

**ADÜ ZİRAAT DERG**

*Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty*

Cilt (Volume): 16

Sayı (Issue): 1

Haziran (June) 2019

**ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ**  
**ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ**  
(ADÜ ZİRAAT DERG)

*JOURNAL OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY AGRICULTURAL FACULTY*

ISSN **1304-7787**

Cilt  
(Volume) **16**

Sayı  
(Issue) **1**

Haziran  
(June) **2019**

**ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ**

(ADÜ ZİRAAT DERGİ)

JOURNAL OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY AGRICULTURAL FACULTY

Cilt (Volume): 16, Sayı (Issue): 1, Haziran (June) 2019

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi tarım bilimleri alanında (bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, tarımsal biyoteknoloji, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, su ürünleri mühendisliği, gıda ve süt teknolojisi, zootekni ve benzeri çoğu temel ve uygulamalı araştırma) yapılan özgün çalışmalar ile derlemeleri hakem incelemesi sonunda yayınlayan, Türkçe, ulusal, bilimsel bir dergidir. Dergi; 2004 yılından günümüze, altı ayda bir olmak üzere yılın altıncı ve on ikinci aylarında çıkarılmakta ve iki sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. Dergi TR Dizin (**ULAKBİM**), **EBSCOHost** (Academic Search Complete), **CrossRef** ve **Google Akademik** tarafından taranmaktadır.

Dergide öncelikli olarak araştırmalar, bunun yanında hakem kurulunun onayladığı derlemeler de yayınlanmaktadır. Lisans üstü tezlerinden üretilmiş olan yayınlar "Lisans üstü tezinden üretilmiştir" ibaresi ile hakemlere gönderilmektedir.

Bir yazının yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve yayına uygun görülmesi gerekmektedir. Makale için konusu ile ilgili en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi alındıktan sonra yayınlama kararı alınmaktadır. Editörler makaleyi hakemlere göndermeden ret edebilir.

Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerik, sonuç ve yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Editörleri ve Danışma Kurulu yayınlanan içerikten sorumlu değildir.

Makale başvuruları <http://dergipark.gov.tr/aduziraat> adresinden kabul edilmektedir. Başka iletişim araçları (mektup, e-posta vs.) ile yayın kabulü ya da yazar/hakem yazışmaları yapılmamaktadır. Makale yollandıktan sonra yazar eklenemez veya çıkartılamaz. Tüm yazarlar makalenin son halini inceleyip onaylamalıdır. Ayrıca diğer önemli hususlar derginin arka sayfasında "Yazarlara Önemli Not" başlığı altında verilmiştir.

**Yayınlayan - Published By**

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Türkiye

**Sahibi - Owner**

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü

Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR

**Yayın Kurulu Onursal Başkanı****Honory President of the Editorial Board**

Prof. Dr. İbrahim GENÇSOYLU

**Baş Editör - Editor in Chief**

Dr. Öğr. Üyesi Filiz YILDIZ AKGÜL

**Editörler Kurulu - Editorial Board**

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin UYSAL

Dr. Ahmet Önder ÜSTÜNDAĞ

Dr. Ebru YILMAZ

**Danışma Kurulu - Advisory Board**

Prof. Dr. Atakan KOÇ (Adnan Menderes Üniv.)

Prof. Dr. Cafer TURGUT (Adnan Menderes Üniv.)

Prof. Dr. Cemal ATICI (Adnan Menderes Üniv.)

Prof. Dr. Deniz ÇOBAN (Adnan Menderes Üniv.)

Prof. Dr. Erhan AKKUZZU (Ege Üniv.)

Prof. Dr. Fuat SEZGİN (Adnan Menderes Üniv.)

Prof. Dr. Gonca GÜNNER DALKILIÇ (Adnan Menderes Üniv.)

Prof. Dr. Hüseyin BAŞAL (Adnan Menderes Üniv.)

Prof. Dr. Kemal Tülühan YILMAZ (Çukurova Üniv.)

Prof. Dr. Mehmet Ali ÇULLU (Harran Üniv.)

Prof. Dr. Mehmet AYDIN (Adnan Menderes Üniv.)

Prof. Dr. Soner BALCIOĞLU (Akdeniz Üniv.)

Prof. Dr. Mennan YILDIRIM (Adnan Menderes Üniv.)

Asst. Prof. Sunday O PETERS (Berry Collage, USA)

Doç. Dr. Ayşe Demet KARAMAN (Adnan Menderes Üniv.)

Doç. Dr. Barış KARA (Adnan Menderes Üniv.)

Doç. Dr. Mehmet BOZOĞLU (Ondokuz Mayıs Üniv.)

Dr. Öğr. Üyesi Burcu MESTAV (Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.)

Dr. Öğr. Üyesi Soner AKGÜL (Çukurova Üniv.)



• Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi • ISSN 1304-7787 • 2004-2019

**Adnan Menderes Üniversitesi**

Ziraat Fakültesi, Güney Yerleşke 09100, AYDIN / TÜRKİYE

**Tel:** 0 (256) 772 70 23 **Faks:** 0 (256) 772 72 33**E-posta:** ziraatdergi@adu.edu.tr **Web:** <http://dergipark.gov.tr/aduziraat>

Adnan Menderes Üniversitesi Basımevi, AYDIN



# ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY AGRICULTURAL FACULTY

Cilt (Volume): 16, Sayı (Issue): 1, Haziran (June) 2019

## İÇİNDEKİLER/CONTENTS

### ARAŞTIRMA MAKALELERİ/RESEARCH ARTICLES

Nizip Yağlık, Saurani ve Uslu Zeytin Çeşitlerinin Döllenme Biyolojilerinin Araştırılması 1

**Nurengin METE, Öznur ÇETİN, Mehmet HAKAN, Hülya KAYA, Filiz SEFER, Nurcan ULUÇAY, Uğur GÜLOĞLU, Hükümrhan GÜL, Oktay SEZGİN**

Investigation of the Fertilization Biology of Nizip Yaglik, Saurani and Uslu Olives Cultivars

Menemen Koşullarında Pamuk Yetiştiriciliğinde Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Enerji Verimliliği ve Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi 7

**Tuncay TOPDEMİR, Mustafa Bülent COŞKUN**

Determining Energy and Utilization Efficiency of Different Tillage Methods on Cotton Cultivation Under Menemen Plain Conditions

Farklı Hasat Zamanının Pamuk Dikeninin (*Onopordum acanthium*) Kimyasal Kompozisyonu, *In Vitro* Gaz ve Metan Üretimi Üzerine Etkisi 13

**Emre CEYLAN, Adem KAMALAK**

Effect of Different Harvest Stage on Chemical Composition, *In Vitro* Gas and Methane Production of Cotton Thistle (*Onopordum acanthium*)

İzmir Yöresindeki Üreticilerin Mekanizasyon Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 19

**Mustafa Nazım MAVİOĞLU, Ferit ÇOBANOĞLU**

A Research on the Determination of Mechanism Levels of Farmers in İzmir City

Pamukta (*Gossypium hirsutum* L.) Hasadın Kalite Üzerine Etkisi 27

**Hüseyin TERZİ, Mustafa Ali KAYNAK**

The Effect of Harvesting on Quality in Cotton (*Gossypium hirsutum* L.)

Türkiye’de Zeytinyağında Kalite ve Markalaşmanın İncelenmesi

35

**Dilek ÖZDOĞAN, Renan TUNALIOĞLU**

Examination of Quality and Branding on Olive Oil in Turkey

Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisinde Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi

45

**Gülden BALCI, Hakan KELES**

Determination of Adaptation Capabilities of Some Blackberry Varieties in Yozgat Ecology

Farklı Yeşil Budama Uygulamalarının Merlot (*Vitis vinifera* L.) Üzüm Çeşidinde Tane Olgunluğu Üzerine Etkileri

53

**Serkan CANDAR, Elman BAHAR, İlknur KORKUTAL, Tezcan ALÇO, Mehmet GÜLCÜ**

The Effects of Different Green Pruning Applications on Berry Maturaton in Merlot (*Vitis vinifera* L.)

Çilekte Kök ve Taç Çürüklüğü Hastalığı (*Phytophthora cactorum*)’na Karşı Kök Bakterileri ile Biyolojik Mücadele

63

**Ümit ÖZYILMAZ, Kemal BENLİOĞLU**

Biological Control of Root and Crown Rot Disease of Strawberry (*Phytophthora cactorum*) with Rhizobacteria

Kentsel Yeşil Alanların Karakteristik Özellikleri ile İnsanların Fiziksel Aktivite Sıklıkları ve Süresi Arasındaki İlişki Nedir?

73

**Abdullah AKPINAR**

What are the Relationships between Characteristics of Urban Green Spaces and People’s Frequency and Duration of Physical Activity?

The Effects of Foliar Applied Atonik and Amino Acid on Yield and Fiber Quality in Cotton (*Gossypium hirsutum* L.)

81

**Güliz AKSONA, Aydın ÜNAY**

Atonik ve Amino Asit Yaprak Uygulamalarının Pamukta (*Gossypium hirsutum* L.) Verim ve Lif Kalitesi Üzerine Etkisi

## Farklı Yeşil Budama Uygulamalarının Merlot (*Vitis vinifera* L.) Üzüm Çeşidinde Tane Olgunluğu Üzerine Etkileri

**Serkan CANDAR<sup>\*1</sup>**, **Elman BAHAR<sup>2</sup>**, **İlknur KORKUTAL<sup>2</sup>**, **Tezcan ALÇO<sup>1</sup>**,  
**Mehmet GÜLCÜ<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Yetiştirme Tekniği Bölümü

<sup>2</sup> Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü

<sup>3</sup> Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Gıda Teknolojileri Bölümü

**Öz:** Bu çalışma, 2013-2015 yılları arasında Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü bağlarında, 13 yaşındaki Merlot/5BB asmalarda koltuk sürgünleri (Yok, 3-4 yaprak, 6-7 yaprak) ve ana sürgünlerde (1 m, 1.25 m, 1.5 m) yapılan farklı yeşil budama uygulamalarının tane olgunluğu ve bazı olgunluk indislerine olan etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Özellikle koltuk sürgünü uygulamalarının, yetiştiricilik yapılan yılın iklim özelliklerine bağlı olarak, istenilen olgunluk indisini yakalayabilmek için suda çözünebilir kuru madde birikimini erkene çekme ya da geciktirme yönünde etkili olduğu belirlenmiştir. Bu süreçlerde yapılacak farklı yeşil budama uygulamalarında fenolojik dönem ve vejetasyonun iklim özellikleri belirleyici kriterler olarak değerlendirilmelidir.

**Anahtar Kelimeler:** taç yönetimi, SÇKM, olgunluk göstergeleri, Merlot

**The Effects of Different Green Pruning Applications on Berry Maturaton in Merlot (*Vitis vinifera* L.)**

**Abstract:** This study was carried out between 2013-2015 years in the vineyards of Tekirdağ Viticulture Research Institute, in order to examine the effects of different green pruning applications to lateral shoots (None, 3-4 leaves, 6-7 leaves) and to main shoots (1 m, 1.25 m, 1.5 m) on berry maturity and some maturity indexes on 13 years old Merlot/5BB vines. It has been determined that, especially lateral shoots applications are effective to closer or delay the desired maturity indices depending on the climate characteristics of the year. The phenological period and the climatic specifications of the vegetation should be considered as the determining criteria in the manipulations to be carried out in these processes.

**Keywords:** canopy management, TSS, maturity indicators, Merlot

### GİRİŞ

Sıcaklık, asmanın büyüme ve gelişme süreçlerinin düzenlenmesinde rol alan en önemli faktördür. Küresel sıcaklıklar geçen yüzyılda ortalama 0.4-0.8 °C artmıştır (Anonim, 2007). Yirmi birinci yüzyılın sonlarına doğru Türkiye’de 1-4 °C (Türkeş, 2002), küresel ortalamalarda ise sera gazı salınım seviyelerine de bağlı olmak üzere, 4-5 °C civarında sıcaklık artışı beklenmektedir (Anonim, 2013).

İtalya, Almanya ve Fransa gibi önemli şarap üreticisi ülkelerde ve dünyanın diğer bölgelerinde yapılan araştırmalar iklim değişikliği sürecinin geleceğe dönük bir beklenti olmaktan öte günümüzde yaşanmaya başladığını ortaya koymaktadır. Avrupa kıtasında yetiştirme dönemlerinin kıaldığı ve fenolojik aşamaların daha erken meydana geldiği (Chuine ve ark., 2004; Jones ve ark., 2005; Dalla ve ark., 2010; Bock ve ark., 2011; Daux ve ark., 2012) görülmekte; benzer değişiklikler Avusturyalı araştırmacılar tarafından da desteklenmektedir (Webb ve ark., 2011; Sadras ve Petrie, 2011).

Fenolojik süreçlerin bu denli erken ve hızlı gerçekleşmesi olgunlaşmanın hızlanmasına ve şarap kalitesi üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır (Webb ve ark., 2008). Önolojik olgunluğun dengeli biçimde gerçekleşmesi için

endüstriyel, fenolik ve aromatik olgunlukların aynı ölçüde dengeli süreçlerle ortaya çıkması gerekir.

Sıcaklığa bağlı nedenler ile tanede aşırı şeker birikiminin şaraptaki alkol miktarını fazla yükseltmesi (Godden ve Gishen, 2005; Petrie ve Sadras, 2008), asitliğin çok düşmesi (Vrsic ve Vodovnik, 2012), yüksek pH ve şarapta tip dışı aromaların ortaya çıkması (Bahar ve ark., 2012; Poni ve ark., 2013; Palliotti ve ark., 2013; Parker ve ark., 2016) gibi birçok olumsuzluk bağcılık ve şarapçılık profesyonellerini düşündüren konular olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu süreçlerin yönetilmesinde düşük maliyetle ve hızlıca uygulanabilir olması nedeniyle farklı taç yönetimi uygulamalarının önemi birçok çalışmada vurgulanmıştır (Olsen ve ark., 2011; Bahar ve ark., 2018)

Bu çalışmada farklı yaprak alanı azaltma işlemleri uygulanan Merlot çeşidi asmalarda, yeşil budama uygulamalarının

**Sorumlu Yazar:** [serkan.candar@tarimormen.gov.tr](mailto:serkan.candar@tarimormen.gov.tr) Bu çalışma doktora tez ürünüdür ve T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından TAGEM/BBAD/2013/A08/P04-08 numaralı proje ile desteklenmiştir.

**Geliş Tarihi:** 1 Şubat 2019

**Kabul Tarihi:** 1 Temmuz 2019

farklı iklim özelliği gösteren 3 yılda endüstriyel olgunluk bileşenleri ve endüstriyel olgunluğu nasıl etkilediği araştırılmıştır.

## **MATERYAL ve YÖNTEM**

### **Materyal**

Çalışma Merlot/5BB aşı kombinasyonu asmalarda 2013-2015 yılları arasında yürütülmüştür. Asmalara duvar sisteminde Guyot (çift kollu) terbiye şekli verilmiştir. Gövde yüksekliği 60 cm olup, yatırma teli ile 1. bağlama teli arasındaki mesafe 60 cm; 1. bağlama teli ile 2. bağlama teli arasındaki mesafe 40 cm'dir. Denemenin yürütüldüğü yıllarda bitkilerin yaşı 11-13 arasında değişmiştir. Deneme Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü araştırma parsellerinde 40° 58' K ile 27° 28' D koordinatlarındaki bağlarda kurulmuştur. Bağıın dikim yönü Kuzey-Güney olup, düz zemindedir. Deneme parseline ait 0-30 cm, 30-60 cm ve 60-90 cm derinliğindeki toprak analizleri sonucunda; killi-tınlı bünyede, pH tüm toprak derinliklerinde hafif alkali, tuzluluk bakımından tuzsuz, kireçli sınıfa girmekle birlikte; birikiminin 60-90 cm toprak derinliğinde olduğu görülmüştür. Organik madde bakımından da az derin toprak tabakasında yetersiz sınıfta yer almaktadır.

### **Yöntem**

Denemede koltuk sürgünü uygulamaları; tüm yaprakları alınmış koltuk sürgünü (Yok), dipten 3-4 yaprağı üzerinde bırakılmış koltuk sürgünü (3-4 yaprak), ve dipten 6 - 7 yaprağı üzerinde bırakılmış koltuk sürgünü (6-7 yaprak) uygulamalarından oluşmuştur. Ana sürgün uygulamalarında ise yazlık sürgünler 1 m, 1.25 m ve 1.5 m uzunluklarından sınırlandırılmıştır. Koltuk sürgünü uygulamaları Lorenz ve ark. (1995)'e göre ben düşme döneminde (EL 35), ana sürgün uygulamaları da sürgün uzunlukları 170-180 cm civarına ulaştığı dönemde (EL 31-33) yapılmış ve hasat sonuna kadar bu yaprak alanları korunmuştur.

Her 3 yılda da kış budamalarında 16 göz üzerinden budama yapılmış, buna rağmen asmalarda gelişme farklılıkları görülmüş ise salkım ve sürgün sayıları 30-40 cm civarına ulaştığında (EL 15-17) müdahaleler yapılarak asmalar arasında tekdüzelik sağlanmıştır.

Araştırma süresince tüm parsellerde yetiştiricilik uygulamaları standart olarak uygulanmıştır. Olgunluk üzerinde görülebilecek değişkenliğin verimden kaynaklanmasını önlemek amacıyla her 3 yılda da verim sınırlandırılması ve eşitlenmiştir. Bu şekilde farklı yıllar içinde ve yıllar ortalamasında verim değerleri istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Ancak 2014 yılındaki olağan dışı yağışlardan kaynaklanan hastalık sorunu nedeniyle ve 2015 yılında şarjın daha yüksek olarak bırakılması nedeniyle yıllar arasında verim bakımından istatistiki farklılıklar görülmektedir. 2015 yılı 8.96 kg/omca ile en yüksek

ortalama verimin alındığı yıl olurken 2014 yılında verim 0.64 kg/omca olarak belirlenmiştir.

Deneme bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Alınan verilere JMP 7.0.1 versiyonlu istatistik programında varyans analizi yapılmıştır. Varyans analizi sonucunda ana sürgün ve koltuk sürgünü uygulama interaksyonu etkileri, ana sürgün ana etkisi (ASAE) ve koltuk sürgünü ana etkisi (KSAE) oluşmuştur. Çizelgelerde ana etkilerin ortalamaları LSD (0.05) çoklu karşılaştırma testi ile karşılaştırılmış, 3 yılın sonunda yıl birleştirmeleri ve istatistiki değerlendirmeleri yapılmıştır.

### **Araştırmada İncelenen Kriterler**

Şırada endüstriyel olgunluğun belirlenmesi amacıyla; el tipi refraktometre (ATAGO Co. Ltd. Tokyo, Japan) ile SÇKM (°Brix) % olarak; titrimetrik yöntemle tartarik asit cinsinden titre edilebilir asit (g/L) (Cemeroğlu, 2007) olarak belirlenmiştir. pH (Mettler Toledo FE20 marka dijital) pH metre ile ölçülmüştür. Bir gram üzüme düşen şeker miktarı (mg/g-tane), tanedeki şeker miktarının tane yaş ağırlığına bölünmesiyle hesaplanmıştır (Ferrer ve ark., 2014). Olgunluk göstergeleri; °Brix / Titre edilebilir asit, ve pH<sup>2</sup> x °Brix değerleri Blouin ve Guimberteau (2000)'e göre hesaplanmış ve değerlendirilmiştir.

### **BULGULAR ve TARTIŞMA**

#### **Tekirdağ ili iklim verileri**

Denemenin yürütüldüğü yıllarda vejetasyon periyodundaki etkili sıcaklık toplamı 2013 yılı için 2157.00 gün derece, 2014 yılı için 2074.64 gün derece ve 2015 yılı için 2142.00 gün derece olarak hesaplanmıştır. Tekirdağ ili için 1939-2017 yılları ortalaması ise 1887.00 gün derece'dir.

Tekirdağ yıllık toplam yağış miktarı 1939-2017 yılları için 581.10 mm'dir. 2013 yılı toplam yağışı 443.80 mm. 2014 yılı toplam yağış 770.50 ve 2015 yılında ise toplam yağış 507.90 mm olarak tespit edilmiştir (Anonim 2014; Anonim 2015; Anonim 2016).

Çalışmanın yürütüldüğü 3 yıl içinde 2014 yılı sıcaklık ve yağış miktarı yanında, güneşlenme şiddeti, oransal nem, rüzgar hızı gibi iklim özellikleri bakımından diğer iki yıldan ayrılmaktadır (Anonim, 2015).

#### **Suda çözünebilir kuru madde (SÇKM) (%)**

Farklı koltuk sürgünü uzunluğu ve ana sürgün uzunluğu uygulamalarının suda çözünebilir kuru madde (SÇKM) üzerine etkileri ana sürgün ve koltuk sürgünü uygulamalarının ana etkilerinde 2013 yılı için  $p < 0.05$  düzeyinde önemli bulunmuştur. SÇKM miktarı bakımından "6-7 yaprak" ve "3-4 yaprak" uygulamalarının (sırasıyla %22.85 ve %22.65) en yüksek değere ulaştığı belirlenmiştir. "Yok" uygulamasının ise %21.18 değeri ile son sırada yer aldığı saptanmıştır. Ana sürgün uzunluklarında "1.5 m" uygulaması %22.56 ile en yüksek değerlere ulaşırken, "1.25 m" uygulaması %22.23 ile diğer bir istatistiki grubu

oluşturmuştur. “1 m” uygulaması %21.90 SÇKM miktarı ile sonuncu sırada yer almıştır (Çizelge 1).

2014 yılında SÇKM üzerine etkiler koltuk sürgünü ana etkisi bakımından LSD %5 düzeyinde önemli bulunmuş, %20.84 ve %20.66 suda çözünebilir kuru madde ile “3-4 yaprak” ve “6-7 yaprak” uygulamalarının daha düşük SÇKM miktarlarına

ulaştığı belirlenmiştir. “Yok” uygulaması ise %21.31 miktarı ile en yüksek kuru madde birikimine ulaşmıştır. Farklı ana sürgün uzunlukları uygulamaları ise SÇKM miktarını istatistiki bakımdan önemli ölçüde etkilememiştir (Çizelge 1).

Çizelge 1. Farklı yeşil budama uygulamalarının SÇKM üzerine etkileri (%)

Ana sürgün uygulaması	Koltuk sürgünü uygulaması	2013		2014		2015		Yıl birleştirme	
		ASAE ort.	KSAE ort.	ASAE ort.	KSAE ort.	ASAE ort.	KSAE ort.	ASAE ort.	KSAE ort.
1 m	Yok								
	3-4 yaprak	21.90 c	21.18 b (Yok)	20.97	21.31 a (Yok)	22.42	22.42 b (Yok)	21.76 b	21.6 b (Yok)
	6-7 yaprak								
1.25 m	Yok								
	3-4 yaprak	22.23 b	22.65 a (3-4 ypr)	20.97	20.84 b (3-4 ypr)	22.80	22.86 a (3-4 ypr)	22.00 a	22.12 a (3-4 ypr)
	6-7 yaprak								
1.5 m	Yok								
	3-4 yaprak	22.56 a	22.85 a (6-7 ypr)	20.86	20.66 b (6-7 ypr)	22.75	22.68 ab (6-7 ypr)	22.06 a	22.07 a (6-7 ypr)
	6-7 yaprak								
Yıllar ortalaması		22.23 B		20.94 C		22.65 A		---	
ASAE LSD <sub>0.05</sub>		0.299		Ö.D		Ö.D		0.209	
KSAE LSD <sub>0.05</sub>		0.629		0.383		0.343		0.342	
Yıllar ortalaması LSD <sub>0.05</sub>		0.342							

2013 KSAE LSD<sub>0.05</sub>: 0.629; ASAE LSD<sub>0.05</sub>: 0.299; 2014 KSAE LSD<sub>0.05</sub>: 0.383; 2015 KSAE LSD<sub>0.05</sub>: 0.343; Yıl birleştirme KSAE LSD<sub>0.05</sub>: 0.342; ASAE LSD<sub>0.05</sub>: 0.209; YIL LSD<sub>0.05</sub>: 0.342

ASAE: Ana sürgün uygulamaları ana etkisi (ortalaması); KSAE: Koltuk sürgünü uygulamaları ana etkisi (ortalaması).

Suda çözünebilir kuru madde üzerine 2015 yılında koltuk sürgünü uygulamaları için “3-4 yaprak” uygulamasında %22.86 ile en yüksek değere ulaşırken, “6-7 yaprak” uygulaması %22.68 ile diğer iki uygulamanın arasında yer bulmuştur. “Yok” uygulaması %22.42 ile farklı bir istatistiki grubu oluşturmuştur. Ana sürgün uzunluğu uygulamalarının ana etkileri SÇKM miktarını istatistiki açıdan önemli ölçüde etkilememiş; “1.25 m” uygulaması %22.80 ve “1.5 m” uygulaması %22.75 SÇKM değerini vermiş; öte yandan “1 m” uygulaması %22.42 değerini vermiştir (Çizelge 1).

Yıllar ortalamaları bakımından 2015 yılı %22.65 ile en yüksek SÇKM görülen yıl olmuştur. 2013 yılında suda çözünebilir kuru madde %22.23 seviyesine ulaşırken en düşük SÇKM birikimi %20.94 ile 2014 yılında görülmüştür. Yıllar ortalamaları istatistiki bakımdan  $p < 0.05$  düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 1).

2013, 2014 ve 2015 yıllarının verileri birleştirilerek değerlendirildiğinde, koltuk sürgünü uygulamalarında “3-4 yaprak” ve “6-7 yaprak” uygulamaları %22.12 ve %22.07 SÇKM ile üst grubu oluştururken “Yok” uygulaması %21.64 ile bir diğer istatistiki grubu meydana getirmiştir. Ana sürgün uzunluğu uygulamalarında ise “1.5 m” ve “1.25 m” uygulamaları %22.02 ve %22.00 SÇKM değerlerine ulaşırken, “1.5 m” uygulaması %21.70 ile diğer istatistiki grubu oluşturmuştur (Çizelge 1).

Suda çözünebilir kuru madde içeriğinde her 3 yılda da “Yok” uygulamasının, diğer koltuk sürgünü uygulamalarından ayrıldığı görülmektedir. 2013 yılında %21.18 ve 2015 yılında %22.42 SÇKM değerleriyle en düşük veriler bu uygulamadan elde edilirken 2014 yılında %21.31 ile en yüksek SÇKM içeriğinin yine bu uygulamada olduğu görülmüştür. 2014 yılında vejetasyon döneminde meydana gelen aşırı yağışlar ve yüksek oransal nem şartları altında; tamamı alınmış koltuk sürgünü uygulamasının (Yok) fizyolojik aktiviteyi olumlu yönde etkileyerek fotosentez etkinliğini ve dolayısıyla asma genelinde kuru madde birikimini hızlandırdığı söylenebilir. Dolayısıyla taç üzerinde doğru zamanda ve doğru şekilde yapılan manipülasyonlarla genel iklim özelliklerinden kaynaklanan olumsuzluklardan az da olsa kaçış yolu olduğu görülmektedir. Araştırmamızla benzer şekilde Zoecklein ve ark. (1992), Korkutal ve Bahar (2013), Palliotti ve ark. (2013) yaptıkları çalışmalarda çeşitli yaprak alma uygulamaları ile SÇKM miktarlarında istenilen yönde etkiler yaratılabildiğini bildirmişlerdir.

Çok belirgin olmamakla birlikte ana sürgün uzunluğundaki artışla birlikte artan stres eğiliminin düşük seviyede de olsa “1.5 m” uygulamasında kuru madde birikimini artırdığı düşünülmektedir.



### Titre edilebilir asit (TA) (g/L)

Farklı sürgün uzunluğu uygulamalarının yaprak alma uygulamaları ana etkilerinin titre edilebilir asit üzerine etkileri istatistiki anlamda yalnızca 2014 yılında koltuk sürgünü uygulamalarında önemli olarak görülmektedir.

2014 yılında farklı koltuk sürgünü uzunluğu uygulamalarının TA üzerine etkileri koltuk sürgünü ana etkisinde  $p < 0.05$  düzeyinde önemli bulunmuştur. 7.80 g/L ve 7.61 g/L TA ile “6-7 yaprak” ve “3-4 yaprak” uygulamalarının daha yüksek TA miktarlarında kaldığı belirlenmiştir. “Yok” uygulaması ise 7.13 g/L ile en düşük TA seviyesine ulaşmıştır. Farklı ana

Çizelge 2. Farklı yeşil budama uygulamalarının titre edilebilir asit üzerine etkileri (g/L)

Ana sürgün uygulaması	Koltuk sürgünü uygulaması	2013		2014		2015		Yıl birleştirme	
		ASAE ort.	KSAE ort.	ASAE ort.	KSAE ort.	ASAE ort.	KSAE ort.	ASAE ort.	KSAE ort.
1 m	Yok								
	3-4 yaprak	5.85	5.96 (Yok)	7.45	7.13 b (Yok)	5.85	5.78 (Yok)	6.38	6.29 (Yok)
	6-7 yaprak								
1.25 m	Yok								
	3-4 yaprak	5.83	5.85 (3-4 ypr)	7.53	7.61 a (3-4 ypr)	5.83	5.86 (3-4 ypr)	6.40	6.42 (3-4 ypr)
	6-7 yaprak								
1.5 m	Yok								
	3-4 yaprak	5.93	5.80 (6-7 ypr)	7.53	7.80 a (6-7 ypr)	5.90	5.93 (6-7 ypr)	6.46	6.52 (6-7 ypr)
	6-7 yaprak								
Yıllar ortalaması		5,87 B		7,51 A		5,86 B		---	
ASAE LSD <sub>0.05</sub>		Ö.D		Ö.D		Ö.D		Ö.D	
KSAE LSD <sub>0.05</sub>		Ö.D		0.273		Ö.D		Ö.D	
Yıllar ortalaması LSD <sub>0.05</sub>		0.378							

2014 KSAE LSD<sub>0.05</sub>: 0.273; 2015 KSAE LSD<sub>0.05</sub>: 0.343; Yıl birleştirme YIL LSD<sub>0.05</sub>=0.378

ASAE: Ana sürgün uygulamaları ana etkisi(ortalaması); KSAE: Koltuk sürgünü uygulamaları ana etkisi (ortalaması).

Korkutal ve ark. (2017), koltuk yapraklarının asmadan tamamen çıkarılmasının toplam asitlik miktarını artırdığını bildirmiştir. Çalışmamızda 2013 yılında koltuk sürgünlerinin tamamen uzaklaştırıldığı “Yok” uygulamasında sayısal olarak benzer durum görülürken 2014 ve 2015 yıllarında ve tüm yılların ortalamasında “Yok” uygulamasının daha düşük TA değerine neden olduğu görülmektedir.

Sıcaklık ve tane kalitesi arasındaki en belirgin ilişkilerden biri, yüksek sıcaklıkların tanede organik asit konsantrasyonunu azaltmasıyla ortaya çıkar (Kliwer, 1973). Tane gelişiminin farklı aşamalarında organik asit birikimi ve parçalanması da farklı evrelerden geçer (Ford, 2012). Tartarik asit ve malik asitler tane gelişiminin tüm aşamalarına baskın organik asitler olup sıra asitliği ve pH üzerinde önemli etkilere neden olur (Morris ve ark., 1983). Özellikle malat ben düşme dönemine kadar tanede biriktirilerek olgunlaşma sürecinde ortaya çıkan karbon ihtiyacı için potansiyel bir kaynak olarak saklanır (Ruffner, 1982). Bu dönemde malik asidin harcanarak azalması toplam asitliği azaltarak şeker ve asit oranlarını dengeler (Kliwer, 1965). Bu durum denemenin yürütüldüğü yıllar

sürgün uzunlukları uygulamalarının ise titre edilebilir asit değerlerini istatistiki bakımdan önemli ölçüde etkilemediği gözlenmiştir. “1.5 m” uygulaması 7.56 g/L ile en yüksek TA seviyesinde kalırken, “1.25 m” uygulaması 7.53 g/L ve “1 m” uygulaması 7.45 g/L TA değerleri vermişlerdir (Çizelge 2).

Yıllar ortalamaları incelendiğinde 2014 yılında 7.51 g/L ile en yüksek TA değerinin ölçüldüğü görülmektedir. 2013 ve 2014 yıllarında titre edilebilir asit 5.87 g/L ve 5.86 g/L seviyelerine düşmüştür. Yıllar ortalamaları ana etkileri istatistiki açıdan önemli bulunmuştur (Çizelge 2).

içinde en kurak yıl olan 2013 yılında koltuk sürgünlerinin tamamen uzaklaştırılmasının yüksek sıcaklıklar bakımından asmalarda etkin fotosentezin azalmasına neden olarak malik asitin karbon kaynağı olarak kullanımını azaltması ve dolayısıyla toplam asitliğin de yüksek kalmasına neden olması olarak yorumlanabilir.

Diğer yandan ana sürgün uzunluğundaki artış yıllar ortalamasında TA artışına da neden olmuştur. Yaşasın ve ark. (2014)’e göre ise istatistiki olarak önemli olmamakla birlikte ana sürgün uzunluğu artışı toplam asitliğin azalmasına neden olmaktadır.

### pH Değeri

pH değerlerinin yalnızca 2014 yılında farklı ana ve koltuk sürgünü uzunlukları ana etkileri bakımından istatistiki olarak önemli olarak belirlenmiştir.

2014 yılında farklı koltuk sürgünü uzunluğu uygulamalarının pH üzerine etkileri koltuk sürgünü ana etkisinde  $p < 0.05$  düzeyinde önemli bulunmuştur. “Yok” uygulaması 3.58 pH ile en yüksek seviyeye ulaşırken, “3-4 yaprak” uygulaması 3.54 ve “6-7 yaprak” uygulaması 3.50 olarak ölçülmüş ve her uygulama farklı bir istatistiki grubu oluşturmuştur.

Yıllar ortalamalarında 2014 yılı 3.54 ile en düşük pH görülen yıl olmuştur. 2013 ve 2014 yıllarında titre edilebilir asit 3.79 ve 3.75 seviyelerine düşmüştür. Yıllar ortalamaları istatistiki Çizelge 3. Farklı yeşil budama uygulamalarının pH üzerindeki etkileri

bakımdan  $p < 0.05$  düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 3).

Ana sürgün uygulaması	Koltuk sürgünü uygulaması	2013		2014		2015		Yıl birleştirme	
		ASAE ort.	KSAE ort.	ASAE ort.	KSAE ort.	ASAE ort.	KSAE ort.	ASAE ort.	KSAE ort.
1 m	Yok								
	3-4 yaprak	3.85	3.90 (Yok)	3.54	3.58 a (Yok)	3.75	3.75 (Yok)	3.71	3.74 (Yok)
	6-7 yaprak								
1.25 m	Yok								
	3-4 yaprak	3.74	3.84 (3-4 ypr)	3.54	3.54 b (3-4 ypr)	3.73	3.75 (3-4 ypr)	3.67	3.65 (3-4 ypr)
	6-7 yaprak								
1.5 m	Yok								
	3-4 yaprak	3.79	3.65 (6-7 ypr)	3.53	3.50 c (6-7 ypr)	3.77	3.75 (6-7 ypr)	3.70	3.70 (6-7 ypr)
	6-7 yaprak								
Yıllar ortalaması		3.79 A		3.54 B		3.75 A		---	
ASAE LSD <sub>0.05</sub>		Ö.D		Ö.D		Ö.D		Ö.D	
KSAE LSD <sub>0.05</sub>		Ö.D		0.034		Ö.D		Ö.D	
Yıllar ortalaması LSD <sub>0.05</sub>		0.197							

2014 KSAE LSD<sub>0.05</sub>: 0.034; Yıl birleştirme YIL LSD<sub>0.05</sub>=0.197

ASAE: Ana sürgün uygulamaları ana etkisi (ortalaması); KSAE: Koltuk sürgünü uygulamaları ana etkisi (ortalaması).

Çalışmada 2013 ve 2014 yıllarında koltuk sürgünü uygulamaları ana etkisindeki yaprak alanı azalmasıyla artan pH değerleri dikkati çekmektedir. 2014 yılındaki bu değişim istatistiki olarak da önemlidir. Diğer yandan sıra dışı yağışların görüldüğü 2014 yılında potasyum miktarlarındaki artışın pH değerlerindeki artışa etkisi olmaktadır. Koltuk sürgünü uygulamaları ve pH arasındaki bu ilişki yıllar ortalamasında ortaya çıkmasa da titre edilebilir asitlik, potasyum ve bunların bağlı olduğu yağış miktarı gibi değişkenler arasındaki ilişkiyi yansıtmaları bakımından önemlidir.

#### Gram üzüme düşen şeker miktarı (mg/g-tane)

Bir gram taneye düşen şeker miktarı üzerine farklı sürgün uzunluklarının etkilerinin SÇKM etkileriyle paralel seyir izlediği görülmektedir. 2013 yılında farklı koltuk sürgünü Çizelge 4. Farklı yeşil budama uygulamalarının bir gram üzüme düşen şeker miktarı üzerine etkileri (mg/g-tane)

uzunluğu ve ana sürgün uzunluğu uygulamalarının bir gram üzüme düşen şeker miktarı üzerine etkileri ana sürgün ana etkisi ve koltuk sürgünü ana etkisi konularında  $p < 0.05$  düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4). 172.85 mg/g-tane ve 171.14 mg/g-tane şeker miktarı ile “6-7 yaprak” ve “3-4 yaprak” uygulamalarının en yüksek bir gram üzüme düşen şeker miktarlarına ulaştığı belirlenmiştir. “Yok” uygulaması ise 158.11 mg/g-tane ile son sırada yer almıştır. Ana sürgün uygulamaları ana etkileri istatistiki bakımdan  $p < 0.05$  düzeyinde önemlidir. “1.5 m” uygulaması 170.29 mg/g-tane ile en yüksek değerlere ulaşırken, “1.25 m” uygulaması 167.35 mg/g-tane ile diğer bir istatistiki grubu oluşturmuştur. “1 m” uygulaması 164.41 mg/g-tane şeker miktarı ile sonuncu sırada yer almıştır.

Ana sürgün uygulaması	Koltuk sürgünü uygulaması	2013		2014		2015		Yıl birleştirme	
		ASAE ort.	KSAE ort.	ASAE ort.	KSAE ort.	ASAE ort.	KSAE ort.	ASAE ort.	KSAE ort.
1 m	Yok								
	3-4 yaprak	164.41 c	158.11 b (Yok)	156.22	159.15 a (Yok)	169.00	169.03 b (Yok)	163.21 b	162.09 b (Yok)
	6-7 yaprak								
1.25 m	Yok								
	3-4 yaprak	167.35 b	171.10 a (3-4 ypr)	156.22	155.05 b (3-4 ypr)	172.40	172.96 a (3-4 ypr)	165.32 a	166.37 a (3-4 ypr)
	6-7 yaprak								
1.5 m	Yok								
	3-4 yaprak	170.29 a	172.85 a (6-7 ypr)	155.26	153.48 b (6-7 ypr)	171.99	171.40 ab (6-7 ypr)	165.84 a	165.91 a (6-7 ypr)
	6-7 yaprak								
Yıllar ortalaması		167.35 A		155.90 C		171.13 A		---	
ASAE LSD <sub>0.05</sub>		2.659		Ö.D		Ö.D		1.866	
KSAE LSD <sub>0.05</sub>		5.615		3.386		3.076		3.035	
Yıllar ortalaması LSD <sub>0.05</sub>					3.035				

2013 KSAE LSD<sub>0.05</sub>: 5.615; ASAE LSD<sub>0.05</sub>: 2.659; 2014 KSAE LSD<sub>0.05</sub>: 3.386; 2015 KSAE LSD<sub>0.05</sub>: 3.076; Yıl birleştirme KSAE LSD<sub>0.05</sub>: 3.035; ASAE LSD<sub>0.05</sub>: 1.866; YIL LSD<sub>0.05</sub>=3.035

ASAE: Ana sürgün uygulamaları ana etkisi (ortalaması); KSAE: Koltuk sürgünü uygulamaları ana etkisi (ortalaması).

2014 yılında 153.48 mg/g-tane ve 155.05 mg/g-tane şeker miktarı ile “6-7 yaprak” ve “3-4 yaprak” uygulamalarının daha düşük şeker miktarlarına ulaştığı belirlenmiştir. “Yok” uygulaması ise 159.15 mg/g-tane ile en yüksek şeker miktarı birikimine ulaşmıştır. 2014 yılında farklı koltuk sürgünü uzunluğu uygulamalarının bir gram üzüme düşen şeker miktarı üzerine etkileri koltuk sürgünü ana etkisi bakımından  $p < 0.05$  düzeyinde önemli bulunmuştur. Farklı ana sürgün uzunlukları uygulamaları ana etkileri bir gram üzüme düşen şeker miktarını istatistiki açıdan önemli ölçüde etkilememiştir (Çizelge 4).

2015 yılında benzer şekilde “3-4 yaprak” uygulaması 172.96 mg/g-tane ile en yüksek şeker miktarına ulaşırken, “6-7 yaprak” uygulaması 171.40 mg/g-tane ile diğer iki uygulamanın arasında yer bulmuştur. “Yok” uygulaması 169.03 mg/g-tane ile farklı bir istatistiki grubu oluşturmuştur. Ana sürgün uygulamaları ana etkisi ise bir gram üzüme düşen şeker miktarını istatistiki bakımdan önemli ölçüde etkilememiştir.

Yıllar ortalamaları bakımından 2015 yılında 171.13 mg/g-tane ile en yüksek şeker miktarlarının görüldüğü yıl olmuştur. 2013 yılında bir gram üzüme düşen şeker miktarı 167.55 mg/g-tane seviyesine ulaşırken en düşük şeker miktarı 155.90 mg/g-tane ile 2014 yılında görülmüştür (Çizelge 4).

Son yıllarda hasat zamanına karar verirken şeker konsantrasyonu yerine tanedeki şeker miktarının ölçümü tercih edilmekte ve daha net sonuçlar elde edilmektedir (Bahar ve ark., 2018). Bir gram üzüme düşen şeker miktarı ise tanedeki şeker miktarının tane yaş ağırlığına bölünerek tanedeki her bir grama denk gelen şeker miktarının mg cinsinden olarak ifadesidir. 2013 ve 2015 yıllarına benzer iklim özellikleri gösteren yıllarda yapılan farklı çalışmalarda (Hunter, 1997; Bahar ve ark., 2018) koltuk yapraklarının tane şeker miktarını yükselttiği ifade edilmiştir. Bununla birlikte SÇKM seviyelerinde olduğu gibi 2014 yılında koltuk yapraklarının tamamının alındığı “Yok” uygulaması gram üzüme düşen şeker miktarı konusunda öne çıkmıştır.

#### Olgunluk indisi ( $^{\circ}\text{Brix}$ / Titre edilebilir asit)

İlgili kriter bakımından yalnızca 2014 yılının farklı koltuk sürgünü uzunluğu uygulamalarının  $^{\circ}\text{Brix}$  / titre edilebilir asit üzerine etkileri koltuk sürgünü ana etkisinde LSD 0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. 26.50 ve 27.40 oranları ile “6-7 yaprak” ve “3-4 yaprak” uygulamalarının daha düşük değerler oluşturduğu belirlenmiştir. 2014 yılında “Yok” uygulaması ise 29.80 ile en yüksek değere ulaşmıştır. Ana sürgün uzunlukları ana etkileri ise bu değerleri istatistiki bakımdan önemli ölçüde etkilememiştir. “1 m” uygulaması 28.20 g/L ile en yüksek oranlarda kalırken, “1.25 m” uygulaması 27.90 ve “1.5 m” uygulaması 27.60 oranlarına ulaşmışlardır (Çizelge 5).

Çizelge 5. Farklı yeşil budama uygulamalarının  $^{\circ}\text{Brix}$  / titre edilebilir asit üzerine etkileri

Ana sürgün uygulaması	Koltuk sürgünü uygulaması	2013		2014		2015		Yıl birleştirme	
		ASAE ort.	KSAE ort.	ASAE ort.	KSAE ort.	ASAE ort.	KSAE ort.	ASAE ort.	KSAE ort.
1 m	Yok								
	3-4 yaprak	37.80	3.57 (Yok)	28.20	29.80 a (Yok)	38.30	38.80 (Yok)	34.80	34.80 (Yok)
	6-7 yaprak								
1.25 m	Yok								
	3-4 yaprak	38.60	3.94 (3-4 ypr)	27.90	27.40 b (3-4 ypr)	39.10	39.00 (3-4 ypr)	35.20	35.30 (3-4 ypr)
	6-7 yaprak								
1.5 m	Yok								
	3-4 yaprak	38.20	3.94 (6-7 ypr)	27.60	26.50 b (6-7 ypr)	38.60	38.30 (6-7 ypr)	34.80	34.70 (6-7 ypr)
	6-7 yaprak								
Yıllar ortalaması		38.20 A		27.90 B		38.70 A		---	
ASAE LSD <sub>0.05</sub>		Ö.D		Ö.D		Ö.D		Ö.D	
KSAE LSD <sub>0.05</sub>		Ö.D		0.121		Ö.D		Ö.D	
Yıllar ortalaması LSD <sub>0.05</sub>		0.272							

2014 KSAE LSD<sub>0.05</sub>: 1.21; Yıl birleştirme YIL LSD<sub>0.05</sub>=2.72

ASAE: Ana sürgün uygulamaları ana etkisi (ortalaması); KSAE: Koltuk sürgünü uygulamaları ana etkisi (ortalaması).

Yıllar ortalamaları bakımından 2013 ve 2015 yılları 38.70 ve 38.20 ile en yüksek  $^{\circ}\text{Brix}$  / titre edilebilir asit oranlarının görüldüğü yıllar olmuştur. 2014 yılında  $^{\circ}\text{Brix}$  / titre edilebilir asit oranı 27.90 olarak hesaplanmıştır. Yıllar ortalamaları istatistiki bakımdan LSD %5 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 5).

İdeal  $^{\circ}\text{Brix}$  / titre edilebilir asit oranı aralığı Blouin ve Guimberteau (2000) tarafından 30-40 olarak ifade edilmiştir. 2014 yılı hariç diğer yıllarda ve farklı ana ve koltuk sürgünü uygulamalarında bu değerlerin yakalandığı görülmektedir. 2014 yılı koltuk sürgünü uygulamaları ana

etkileri dışından istatistiki olarak önemli etkiler görülmemekle beraber SÇKM ve gram üzüme düşen şeker miktarı kriterlerinde olduğu gibi koltuk sürgünü uygulamalarının yılın iklimine bağlı olarak farklı tepkiler verdiği görülmektedir. Koltuk sürgünlerinde yapılacak düzenlemelerle olgunluğu az miktarda da olsa erkene almak ya da geciktirmek en azından rakamsal ifadelerle olası gözükmemektedir.

#### $\text{pH}^2 \times ^{\circ}\text{Brix}$

2014 yılı dışında farklı koltuk sürgünü uzunluğu ve ana sürgün uzunluğu uygulamalarının  $\text{pH}^2 \times ^{\circ}\text{Brix}$  değerleri

üzerine etkilerinin değişimleri istatistiki olarak önemli bulunmamıştır.

2014 yılında farklı koltuk sürgünü uzunluğu uygulamalarının  $pH^2 \times ^\circ Brix$  üzerine etkileri koltuk sürgünü ana etkisinde  $p < 0.05$  düzeyinde önemli bulunmuştur. 273.52 değeri ile en yüksek  $pH^2 \times ^\circ Brix$  "Yok" uygulaması için hesaplanmış olup, "3-4 yaprak" uygulaması 261.90 ve "6-7 yaprak" uygulaması

253.52 olmuş ve her bir uygulama farklı istatistiki sınıfları ifade etmişlerdir. Farklı ana sürgün uzunlukları uygulamalarının  $pH^2 \times ^\circ Brix$  değerlerini istatistiki açıdan önemli ölçüde etkilemediği gözlenmiştir. "1 m" uygulaması 264.38 ile en yüksek  $pH^2 \times ^\circ Brix$  / seviyesine ulaşırken; "1.25 m" uygulaması 263.26 ve "1 m" uygulaması 261.31 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 6).

Çizelge 6. Farklı yeşil budama uygulamalarının  $pH^2 \times ^\circ Brix$  üzerine etkileri

Ana sürgün uygulaması	Koltuk sürgünü uygulaması	2013		2014		2015		Yıl birleştirme	
		ASAE ort.	KSAE ort.	ASAE ort.	KSAE ort.	ASAE ort.	KSAE ort.	ASAE ort.	KSAE ort.
1 m	Yok								
	3-4 yaprak	324.63	323.85 (Yok)	264.38	273.52 a (Yok)	310.01	315.78 (Yok)	301.67	304.38 (Yok)
	6-7 yaprak								
1.25 m	Yok								
	3-4 yaprak	316.05	302.45 (3-4 ypr)	263.26	261.91 b (3-4 ypr)	317.99	322.52 (3-4 ypr)	299.10	295.63 (3-4 ypr)
	6-7 yaprak								
1.5 m	Yok								
	3-4 yaprak	327.16	341.54 (6-7 ypr)	261.31	253.52 c (6-7 ypr)	324.53	320.22 (6-7 ypr)	304.33	305.09 (6-7 ypr)
	6-7 yaprak								
Yıllar ortalaması		322.61 A		262.98 B		319.51 A		---	
ASAE $LSD_{0.05}$		Ö.D		Ö.D		Ö.D			Ö.D
KSAE $LSD_{0.05}$		Ö.D		8.036		Ö.D			Ö.D
Yıllar ortalaması $LSD_{0.05}$		33.184							

2014 KSAE  $LSD_{0.05}$ : 8.036; YIL  $LSD_{0.05}$ : 33.184

ASAE: Ana sürgün uygulamaları ana etkisi (ortalaması); KSAE: Koltuk sürgünü uygulamaları ana etkisi (ortalaması).

Yıllar ortalamaları bakımından 2013 ve 2015 yılları 322.61 ve 319.51 değerleri ile en yüksek  $pH^2 \times ^\circ Brix$  değerinin görüldüğü yıllar olmuştur. 2014 yıllarında  $pH^2 \times ^\circ Brix$  262.98 olarak hesaplanmıştır. Yıllar ortalamaları istatistiki bakımdan  $LSD$  %5 düzeyinde önemli bulunmuştur. Koltuk sürgünü ve ana sürgün uygulamalarının ana etkileri ise istatistiki açıdan önemli değildir (Çizelge 6).

$pH^2 \times ^\circ Brix$  olgunluk indisine göre 260 değerinin üzerinde taneler tam olgunluğa ulaşmaktadır (Blouin ve Guimberteau, 2000). Her üç yılda ve tüm uygulamalarda bu göstergeye göre; olgunluğa ulaşıldığı görülmektedir. Uygulamalar arasındaki farklar düşük ve istatistiki olarak önemsiz olmakla birlikte farklı taç yönetimi teknikleriyle olgunluk seviyesinde ufak değişimler yaratılabildiği belirlenmiştir. Yıllar arasındaki iklim farklılıklarına bağlı olarak 2014 yılında "Yok" uygulamasının bu olgunluk göstergesinde de diğer uygulamalardan rakamsal olarak ayrıldığı görülmektedir.

#### SONUÇ

Olgunluk göstergelerinin incelenmesi sonucunda uygulamalar arasındaki farklar düşük ve istatistiki olarak önemsiz olmakla birlikte farklı taç yönetimi teknikleriyle olgunluk seviyesinde ufak değişimler yaratılabildiği belirlenmiştir. 2013 ve 2015 yıllarında olduğu gibi vejetasyon döneminde yağışın az, oransal nemin nispeten düşük ve sıcaklıkların yüksek olduğu yetiştirme dönemlerinde 3-4 yapraklı koltuk sürgünü uygulamasının olgunluğu bir miktar erkene almasından söz edilebilir. 2014 yılında ise benzer etki "Yok" uygulamasında görülmektedir. Ana sürgün uzunluğu uygulamalarının endüstriyel olgunluk ve olgunluk göstergeleri ile ilgili kesin etkilerinden söz etmek olası değildir. Dolayısıyla, olgunluğa müdahale etmek

için yapılacak olan yeşil budama uygulamalarının özellikle ben düşme döneminden sonra yılın iklim karakterine ve ulaşılmak istenen hedef ürüne göre planlamasıyla olabileceği düşünülmektedir.

#### KAYNAKLAR

- Anonim (2007) Climate Change 2007. Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, Switzerland. 104p.
- Anonim (2013) Summary for Policymakers. in: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the 5<sup>th</sup> Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA.
- Anonim (2014) 2013 Yılı İklim Değerlendirmesi. [www.mgm.gov.tr/files/iklim/2013-yili-iklim-degerlendirmesi.pdf](http://www.mgm.gov.tr/files/iklim/2013-yili-iklim-degerlendirmesi.pdf) Erişim tarihi: 10.11.2016.
- Anonim (2015) 2014 Yılı İklim Değerlendirmesi. [www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/2014-yili-iklim-degerlendirmesi.pdf](http://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/2014-yili-iklim-degerlendirmesi.pdf) Erişim tarihi: 10.11.2016.
- Anonim (2016) Tekirdağ ili genel istatistik verileri. <https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/ililceleri-statistik.aspx?k=A&m=TEKIRDAG8> Erişim tarihi: 10.11.2016.
- Bahar E, Korkutal İ, Tekin D (2012) Küresel Isınmanın Bağcılık Üzerine Etkileri. Trakya University Journal of Engineering Sciences 13(1): 1-15.
- Bahar E, Korkutal İ, Öner H (2018) Cabernet-Sauvignon Üzüm Çeşidinde Farklı Kültürel İşlemlerin Şıra

- Özellikleri Üzerine Etkileri. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences 32(1): 1-7.
- Blouin J, Guimberteau G (2000) Maturation et Maturite des Raisins. Feret, Bordeaux, ISBN: 2-902416-49-0
- Bock A, Sparks T, Estrella N, Menzel A (2011) Changes in the Phenology and Composition of Wine from Franconia Germany. Climate Research 50: 69-81.
- Cemeroğlu B (2007) Gıda Analizleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, 657s, Ankara.
- Chuine I, Yiu P, Viovy N, Seguin B, Daux V, Ladurie E (2004) Historical Phenology: Grape Ripening as a Past Climate Indicator. Nature 432: 289-290
- Dalla Marta A, Grifoni D, Mancini M, Storchi P, Zipoli G, Orlandini S (2010) Analysis of the Relationships Between Climate Variability and Grapevine Phenology in the Nobile di Montepulciano Wine Production Area. The Journal of Agricultural Science 148(06): 657-666.
- Daux V, Garcia de Cortazar-Atauri I, Yiu P, Chuine I, Garnier E, Le Roy Ladurie, Mestre E, Tardagaulia J (2012) An Open-Database of Grape Harvest Dates for Climate Research: Data Description and Quality Assessment. Climate of the Past 8, 1403-1418.
- Ferrer M, Echeverría G, Carbonneau A (2014) Effect of Berry Weight and Its Components on the Contents of Sugars and Anthocyanins of Three Varieties of *Vitis vinifera* L. Under Different Water Supply Conditions. South African Journal of Enology and Viticulture 35(1): 103-113.
- Ford CM (2012) The Biochemistry of Organic Acids in the Grape. The Biochemistry of the Grape Berry. Bentham Science Publishers. 22: 67-88.
- Godden P, Gishen M (2005) Trends in the Composition of Australian Wine. The Australian and New Zealand Wine Industry Journal 20(5): 21-46. DOI: 10.1111/ajgw.12195
- Hunter JJ (1997) Implications of Seasonal Canopy Management and Growth Compensation in Grapevine. South African Journal of Enology and Viticulture 21(2): 81-91.
- Jones GV, White MA, Cooper OR, Storchmann K (2005) Climate Change and Global Wine Quality. Climatic Change 73(3): 319-343.
- Korkutal İ, Bahar E (2013) Influence of Different Soil Tillage and Leaf Removal Treatments on Yield, Cluster and Berry Characteristics in cv. Syrah (*Vitis vinifera* L.). Bulgarian Journal of Agricultural Science 19: 652-663.
- Korkutal İ, Bahar E, Bayram S (2017) Farklı Toprak İşleme ve Yaprak Alma Uygulamalarının Syrah Üzüm Çeşidinde Su Stresi, Salkım ve Tane Özellikleri Üzerine Etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 54(4): 397-407.
- Kliewer WM (1965) Changes in The Concentration of Malates, Tartrates, and Total Free Acids in Flowers and Berries of *Vitis vinifera*. American Journal of Enology and Viticulture 16: 92-100.
- Kliewer WM (1973) Berry Composition of *Vitis vinifera* Cultivars as Influenced by Photo Temperatures and Nycto-Temperatures During Maturation. Journal of the American Society for Horticultural Science 98: 153-159.
- Lorenz D, Eichhorn K, Bleiholder H, Klose R, Meier U, Weber E. (1995) Phenological Growth Stages of the Grapevine (*Vitis vinifera* L. ssp. *vinifera*)-Codes and Descriptions According to the Extended BBCH Scale. Australian Journal of Grape and Wine Research 1:100-110.
- Morris JR, Sims CA, Cawthon DL (1983) Effects of Excessive Potassium Levels on pH, Acidity and Color of Fresh and Stored Grape Juice. American Journal of Enology and Viticulture 34: 35-39.
- Olsen JL, Olesen A, Breuning-Madsen H, Balstrom T (2011) A Method to Identify Potential Cold-Climate Vine Growing Sites - A Case Study From Rosnaes in Denmark. Danish Journal of Geography 111: 73-84.
- Palliotti A, Panara F, Silvestroni O, Lanari V, Sabbatini P, Howell GS, Gatti M, Poni, S (2013) Influence of Mechanical Postveraison Leaf Removal Apical to Cluster Zone on Delay of Fruit Ripening in Sangiovese (*Vitis vinifera* L.) Grapevines. Australian Journal of Grape and Wine Research 19: 369-377.
- Parker AK, Raw V, Martin D, Haycock S, Sherman E, Trought MCT (2016) Reduced Grapevine Canopy Size Post-Flowering via Mechanical Trimming Alters Ripening and Yield of Pinot noir. Vitis 55: 1-9.
- Petrie, PR, Sadras VO (2008) Advancement of Grapevine Maturity in Australia Between 1993 and 2006: Putative Causes, Magnitude of Trends and Viticultural Consequences. Australian Journal of Grape and Wine Research 14: 33-45.
- Poni S, Gatt M, Bernizzoni F, Civardi S, Bobeica N, Magnanini E, Palliotti A (2013) Late Leaf Removal Aimed at Delaying Ripening in cv. Sangiovese: Physiological Assessment and Vine Performance. Australian Journal of Grape and Wine Research 19: 378-387.
- Ruffner HP (1982) Metabolism of Tartaric and Malic Acids in Vitis - A Review. Part B. Vitis 21: 346-358.
- Sadras VO, Petrie PR (2011) Climate Shifts in South-Eastern Australia: Early Maturity of Chardonnay, Shiraz and Cabernet-Sauvignon is Associated with Early Onset Rather Than Faster Ripening. Australian Journal of Grape and Wine Research 17: 199-205.
- Türkeş M (2002) İklim Değişikliği Türkiye-İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ilişkileri ve İklim Değişikliği Politikaları <http://www.tubitak.gov.tr> Erişim Tarihi: 18.03.2013.
- Vrsic S, Vodovnik T (2012) Reactions of Grape Varieties to Climate Changes in North East Slovenia. Plant Soil and Environment 58: 34-41.
- Webb LB, Whetton PH, Barlow EWR (2008) Climate Change and Winegrape Quality in Australia. Climate. Research. 36: 99-111.

Webb LB, Whetton PH, Barlow EWR (2011) Observed Trends in Winegrape Maturity in Australia. *Global Change Biology* 17: 2707-2719.

Yaşasın AS, Boz Y, Avcı GG, Gündüz A, Gülcü M, Kiracı MA, Bahar E (2014) Cabernet-Sauvignon Üzüm Çeşidinde Farklı Toprak İşleme ve Sürgün Uzunluğu Uygulamalarının Su Stresi, Verim ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri. TAGEM Proje Sonuç Raporu. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü. Mart 2014.

CANDAR S, BAHAR E, KORKUTAL İ, ALÇO T, GÜÇLÜ M  
Zoecklein BW, Wolf TK, Duncannw, Judge JM, Cook MK (1992) Effects of Fruit Zone Leaf Removal on Yield, Fruit Composition and Fruit Rot Incidande of Chardonnay and White Riesling Grapes (*Vitis vinifera* L.). *American Journal of Enology and Viticulture* 43(2): 139-148.